Bouleau pubescent

Betula pubescens

Plus petit que le bouleau verruqueux, cet arbre peut atteindre 15 à 20 m de hauteur.

No confundir
À ne pas confondre avec le bouleau verruqueux dont les feuilles ont deux niveaux de dents et sont de forme triangulaire.

Conocer
Les rameaux du bouleau étaient autrefois employés pour la confection de balais.

Des études spécifiquement menées pour cette espèce ont montré que l'ouverture des bourgeons au printemps dépend à la fois de la température et de la durée du jour (la photopériode).

Même si c'est peu fréquent, les bouleaux pubescents et verruqueux sont capables de s'hybrider.

Hojas
Elles sont alternes, en forme de losange, simplement dentées (contrairement aux feuilles du bouleau verruqueux avec deux niveaux de dents). Les jeunes rameaux sont souples, avec une courte pilosité et sans verrue (pas de pilosité mais la présence de verrues sur les rameaux du bouleau verruqueux).

Flores
Le bouleau pubescent est une espèce monoïque (fleurs mâles et femelles séparées mais sur le même individu). Les chatons mâles, jaunâtres, sont pendants et longs de 3 à 5 cm pendant la floraison (5 à 10 cm pour le bouleau verruqueux). Les fleurs femelles, plus petites, mesurent 3 cm de long et sont dressées.

Fruto
Les graines ailées sont empilées et forment ainsi des cônes pendants, se désagrégeant sur l'arbre pendant l'été.

Nombres comunes
Bouleau pubescent

Medio
Présent dans tous les massifs français (sauf en Corse), mais moins répandu que le bouleau verruqueux. Il apprécie les sols acides et humides.

Altitud
jusqu'à 2 000m d'altitude

Estación
espèce suivie au printemps et à l'automne Débourrement : début mars - début mai Feuillaison : fin mars - fin mai Floraison : fin mars - fin mai Changement couleur : septembre - novembre

Tamaño
Plus petit que le bouleau verruqueux, cet arbre peut atteindre 15 à 20 m de hauteur.

Bouleau pubescent
Betula pubescens

Phénoclim › Brotación › Todos las yemas siguen cerradas

Phénoclim › Brotación › Alrededor del 10% de las yemas están abiertas. Las demás están cerradas

Phénoclim › Desarollo de las hojas › Las hojas siguen enroscadas

Phénoclim › Desarollo de las hojas › Alrededor del 10% de las hojas se han desplegado, el resto siguen enroscadas

Phénoclim › Floración › Todas las flores siguen cerradas

Phénoclim › Floración › Alrededor del 10% de las flores están abiertas y el resto cerradas

Phénoclim › Floración › Alrededor del 10% de las flores están abiertas y el resto cerradas

Phénoclim › Floración › Alrededor del 10% de las flores están abiertas y el resto cerradas

Phénoclim › El cambio de color de las hojas › Alrededor del 10% de las hojas están empezando a amarillear o se han caído (el resto siguen verdes)

Phénoclim › El cambio de color de las hojas › Demasiado tarde, imposible estimar la fecha correspondiente a alrededor del 50% de cambio de color

Phénoclim › El cambio de color de las hojas › Alrededor del 50% de las hojas han empezado a amarillear o se han caído