

Noisetier

Corylus avellana

Questo arbusto può vivere circa 30 anni. Compongono la sagoma dell'albero diversi tronchi di piccolo diametro, dritti ed eretti, noti come "cespi" (germogli di ceppo). La corteccia è liscia e marrone.

Fioritura: inizio gennaio - fine marzo

Germogliamento: metà febbraio - fine aprile

Fogliazione: metà marzo - fine maggio

Sapere

Chi mi ha bucato la mia nocciola? Il colpevole è il balanino (*Curculio nucum*)! Questo piccolo coleottero depone le larve nelle nocciole ancora verdi. Mentre le larve si nutrono del seme della nocciola, gli adulti attaccano le foglie.

L'impollinazione del nocciolo avviene grazie al vento. Il polline di un esemplare non può impollinare i fiori femminili dello stesso albero, ad eccezione di alcune rare varietà.

Alcune varietà di nocciolo le cui radici sono state associate al fungo giusto possono diventare "alberi da tartufo".

Foglie

Sono alterne, arrotondate, dentate con una punta all'estremità. Le gemme sono piccole, globose e ricoperte di scaglie verdi o marroni.

Fiori

Il nocciolo è una specie monoica (fiori maschili e femminili separati ma sullo stesso esemplare). I fiori maschili sono riuniti in amenti, da 2 a 8 cm, raggruppati in grappoli. Si allungano molto e diventano gialli prima di rilasciare il polline. I fiori femminili sono formati da piccoli peli rossi (gli stili, lunghi pochi millimetri) situati all'estremità di alcune gemme.

Frutta

Sono le nocciole che maturano tra agosto e settembre.



Nomi comuni

Nocciolo

L'ambiente

Presente in tutte le catene montuose francesi, tranne in Corsica, fino a 1800 m di altitudine. Predilige terreni da basici a leggermente acidi.

Altitudine

Fino a 1800 m di altitudine

Stagione

- specie monitorata solo in primavera

Dimensione

Fino a 6 m di altezza

Noisetier

Corylus avellana

